

PRIMJENA ANTIPILEPTIKA U LIJEČENJU AGRESIVNOSTI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE

Tamara Červenjak, Tamara Sabo, Damir Mulc, Antonela Bazina Martinović, Dubravka Kalinić

- Alzheimerovu demenciju (AD), uz kognitivne smetnje, karakteriziraju i poremećaji ponašanja koji uključuju psihomotorni nemir, impulzivnost i agresivnost koji su izazov su pri odabiru psihofarmakoterapije
- Stabilizatori raspoloženja uobičajeno se koriste za ublažavanje oscilacija raspoloženja kod bipolarnog poremećaja, no svoje mjesto zauzimaju i u liječenju bihevioralnih simptoma u sklopu AD
- Primjena lijekova izvan registriranih indikacija postaje sve češća u svim područjima medicine, no posebno je izražena u psihijatriji

Natrijev valproat pokazao je pozitivne rezultate u bihevioralnim i psihičkim simptomima AD u velikom broju studija i prikazima slučajeva što ukazuje na njegovo posebno mjesto u liječenju agresivnosti/agitacije kod pacijenata oboljelih od AD.



Lamotrigin, gabapentin i levetiracetam su također korišteni u liječenju agitiranih dementnih pacijenata, no potrebna su daljnja randomizirana kontrolirana istraživanja za utvrđivanje učinkovitosti i sigurnosti primjene na većem broju ispitanika.

ZAKLJUČAK:

- Antiepileptike je moguće primjeniti kao samostalnu terapiju za bihevioralne simptome kod pacijenata oboljelih od AD ili kao dodatak na dosadašnju terapiju (antidementive)
- Primjena antiepileptika kod pacijenata oboljelih od AD u prednosti je u odnosu na primjenu antipsihotika zbog manjeg broja neželjenih nuspojava kod starijih pacijenata

Reference:

1. Benjamin et al. : Anticonvulsants for behavioral and psychological symptoms in dementia: protocol for a systematic review Systematic Reviews (2019)8:118
2. Heinz C.R. Grunze : The effectiveness of anticonvulsants in psychiatric disorders, Pharmacological aspects, Dialogues in Clinical Neuroscience – Vol 10. No 1., 2008.

Poster je prikazan na 1.kongresu Hrvatske Alzheimer alijanse 19. - 21. svibnja 2021.