

ALZHEIMEROVA BOLEST U OBITELJI

Hrlić M.M., Bektić Hodžić J, Šoštar D., Fremeć M.

Bolesnici koji boluju od Alzheimerove bolesti često su **socijalno izolirani**. Ponašanje bolesnika koji boluje od demencije u velikoj je mjeri društveno neprihvatljivo.

Odbacivanjem iz društvenog života negativno odnosi na bolesnike ali i na članove njihovih obitelji.

Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije. **Svakih sedam sekundi jedna nova osoba oboli od Alzheimerova bolesti u svijetu**, dok u Hrvatskoj svakih 38 minuta oboli jedna osoba. Bolest se dvostruko više pojavljuje kod žena zbog duljeg životnog vijeka, nego kod muškaraca.

Članovi obitelji nisu stručne osobe, pa tako im je potrebno dati dovoljno znanja o **izazovima** s kojima će se susretati u **skrbi** za oboljelog.

Potrebne su promjene i prilagodbe u novom načinu života kao što su prilagodba životnog prostora i pomoć u sprečavanju sindroma sagorijevanja. Član obitelji koji preuzima vodeću ulogu u brizi za oboljelu osobu treba biti spreman na izazove i **reorganizaciju dosadašnjih aktivnosti**.

U obitelji **ulogu njegovatelja** osobe s Alzheimerovom bolesti **najčešće preuzimaju žene** zbog kulturoloških i tradicijskih razloga, tako briga ta oboljelu osobu pada na supruge, snahe ili kćeri.

Sve intervencije se provode sa ciljem bolje **integracije bolesnika i članova obitelji u društveni život i okolinu**. Zdravstveni djelatnici moraju djelovati na stvaranju pozitivnog stava u okolini prema bolesnicima koji boluju od demencije.